

Behandlingschema, till din patient som behandlas med Ovixan®

(mometasonfuroat)



Oviderm® (25% propylenglykol)

– behandlar torr hud

Oviderm® är ett mjukgörande läkemedel med samma ingredienser som Ovixan® kräm, men utan kortison. Propylenglykol har vattenbindande egenskaper. Viss antimikrobiell effekt har uppvisats mot vissa bakterier och jästsvampar, i synnerhet *Malassezia furfur*. Därför är Oviderm® ett utmärkt komplement till patienter som idag är nöjda med Ovixan® kräm.



Ovixan® (mometasonfuroat)

– finns både som kräm och lösning

Ovixan® finns både som kräm och lösning. Både krämen och lösningen appliceras tunt en gång dagligen tills läkning (rodnad och klåda försvunnit). Därefter påbörjas underhållsbehandling¹ med applicering två dagar per vecka under flera veckor. Ovixan® lösning innehåller även 30% propylenglykol.



¹ Vetenskapliga underlag: *Atopisk dermatit. Uppsala, Läkemedelsverket, juni 2023*

Behandling med Ovixan® (mometasonfuroat)

Behandlingsstart

Skriv datum

Mjukgörare

Instruktion (tid/uppnådd symtomförbättring)

1

Inledande behandling:

använd Ovixan® en gång varje dag.

2

Underhållsbehandling:

använd Ovixan® två gånger per vecka.

Du hittar mer information om Ovixan® på www.fass.se eller på bipacksedeln.

Nu var det slut på schema!

Skicka ett mail till derma@galenica.se,
så skickar vi fler.

Förkortad skriftlig produktinformation riktad till hälso- och sjukvårdspersonal enligt art 17. Produkt: Oviderm® 250 mg/g kräm - Sverige

Version/author: 2020-04-30/MAR/revised approval date for SmPC 2021-12-15/COT

Oviderm® (propylenglykol) 250 mg/g kräm, hudskyddande och uppmjukande medel. Oviderm® är ett registrerat läkemedel som kan förskrivas eller köpas receptfritt. **Förpackningsstorlek:** 100 g och 500 g. 500 g ingår i läkemedelsförmånen. **Indikation:** Behandling av torr hud. **Varningar och försiktighet:** Oviderm® ska inte användas på brännskadad hud. Undvik applicering i hörselgången eftersom propylenglykol kan vara ototoxiskt. Innehåller cetostearylalkohol som kan orsaka hudreaktioner. **Graviditet och amning:** Oviderm® ska inte användas på eller omkring bröstvårtorna vid amning. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.

Översyn av produktresumén: 2021-12-14. Galenica AB, P A Hanssons väg 41, 205 12 Malmö.

Förkortad skriftlig produktinformation riktad till hälso- och sjukvårdspersonal enligt art 17**Produkt: Ovixan® 1 mg/g kräm och kutan lösning – Sverige**

Version/author: 2024-04-10/CKY

Ovixan® (mometasonfuroat) 1 mg/g kräm och kutan lösning, stark glukokortikoid (grupp III) till utvärtes bruk för vuxna och barn från 6 år, Rx, F.**Indikation:** Symptomatisk behandling av inflammatoriska hudsjukdomar som svarar på behandling med glukokortikoider (utbredd plackpsoriasis undantagen).**Kontraindikationer:** Används inte vid facial rosacea, acne vulgaris, hudatrofi, perioral dermatit, perianal och genital klåda, blöjdermatit, infektioner, varicella, tuberkulos, syfilis, postvaccinala reaktioner eller på skadad hud.**Varningar och försiktighet:** Användning vid psoriasis ska övervakas noggrant. Används inte på eller i ögonen. Synrubbing kan uppstå. Långtidsbehandling och plötsligt avbrytande av behandling ska undvikas. Används med försiktighet till barn.**Graviditet och amning:** Används endast efter noggrant övervägande. Ovixan® ska inte användas på eller omkring bröstvårtorna vid amning. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.**Översyn av produktresumén:** 2022-10-25. Galenica AB, P A Hanssons väg 41, 205 12 Malmö.**GALENICA**Galenica AB | Medeon Science Park | 205 12 Malmö | www.galenica.se