

Til din patient, som er
blevet ordineret Ovison[®]
(mometasonfuroat)



Ovison (mometasonfuroat)

– kortisoncremen, der ikke lugter

For at opfylde patienternes behov om en bedre kosmetik hos kortisoncremer har Galenica AB udviklet Ovison creme. Ovison er et stærkt virkende glukokortikoid (gruppe III) til symptomatisk behandling af inflammatoriske hudsygdomme – som atopisk eksem og psoriasis. Ovison påføres i et tyndt lag på de berørte hudområde én gang dagligt. Påføringshyppigheden falder herefter gradvis. Cremen er nem at bruge, fordi den ikke lugter.

- **DUFTFRI**
- **FRI FOR KONSERVERINGSMIDLER OG FARVESTOFFER**
- **HOLDBAR I TRE ÅR**
- **INGEN SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER**
- **CREME 30 G (VNR 535883) OG 100 G (VNR 556109) PLASTIKTUBE**

Behandling med Ovison (mometasonfuroat)



Behandlingsstart

Skriv datoen.

1 Indledende behandling:
smør med Ovison hver dag.

Uger

2 Nedtrapning:
smør med Ovison hver anden dag.

Uger

3 Afslutning:
smør med Ovison 2 dage i ugen.

Uger

Fugtighedscreme:

Øvrigt:

Du finder mere information om Ovison (mometasonfuroat) i indlægssedlen eller på medicin.dk

Forkortet produktresumé Ovison® creme (mometasonfuroat, 1 mg/g, stærkt glukokortikoid, gruppe III). Indikationer*: Symptomatisk behandling af inflammatoriske hudsygdomme, der responderer på topikal behandling med glukokortikoider, såsom atopisk dermatitis og psoriasis (eksklusive udbredt plaque psoriasis). **Dosering*:** Voksne (inklusive ældre) og børn (fra 6 år): Ovison påføres i et tyndt lag på de berørte hudområde én gang dagligt. Påføringshyppigheden falder herefter gradvis. **Kontraindikationer*:** Overfølsomhed over for det aktive stof, andre kortikosteroider eller over for hjælpestoffer. Acne rosacea, acne vulgaris, perioral dermatitis, hudatrofi, perianal og genital kløe, allergiske hudreaktioner i "bleområdene", bakterie-, virus- og svampeinfektioner, varicella, tuberkulose, syfilis eller reaktioner på vaccination. Må ikke bruges på sår eller ulcerøs hud. **Bivirkninger og risici*:** Hvis der udvikles irritation eller sensibilisering, skal behandlingen standses. Hvis der udvikler sig en infektion, indføres en passende svampe- eller antibakteriel behandling. Hvis der ikke straks viser sig en gunstig reaktion, skal brugen af kortikosteroiderne afbrydes, indtil infektionen er tilstrækkeligt under kontrol. Patienter, der påfører et topisk steroid på et større område eller områder med okklusion, skal vurderes regelmæssigt med henblik på tegn på hæmning af HPA-aksen. Hvis det bruges i ansigtet, må der ikke anvendes okklusion og behandlinger skal være begrænset til 5 dage. Hvis det bruges i forbindelse med psoriasis, er nøje overvågning af patienten vigtig. Ovison må ikke påføres på øjenlågene. Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog. Brug med forsigtighed til børn. Børn kan være mere følsomme over for påvirkningen af topiske glukokortikoider på HPA-aksen og på Cushings syndrom. Hvis det bruges til et barn må der ikke anvendes okklusion. *Graviditet og amning:* Kortikosteroider passerer placenta. Bør kun anvendes under graviditeten og under amning efter nøje afvejning af risici og fordele. Ovison må ikke påføres på brystet eller den omgivende hud under amning. *Bivirkninger: Meget sjældent:* folliculitis, brændende fornemmelse, telangiectasia, kløe. *Ikke kendt:* Sekundær infektion, furunculose, parestesi, allergisk kontaktdermatitis, perioral dermatitis, hypopigmentering, hypertrikose, striae, maceration af huden, miliaria, acneiforme reaktioner, lokal hudatrofi, irritation, papuløs rosacealignende dermatitis (ansigtshuden), kapillær sensitivitet, tørhed, overfølsomhed, smerter og reaktioner på påføringsstedet. Der er rapporteret om intrakraniell hypertension hos pædiatriske patienter, der fik topiske glukokortikoider. *Overdosering:* Overdreven langvarig anvendelse kan hæmme funktionen af HPA-aksen og fremkalde sekundær hæmning af binyrebarken. Hvis der rapporteres om hæmning af HPA-aksen, skal antallet af påføringer nedsættes eller behandlingen standses, mens den nødvendige forsigtighed iagttages i disse situationer. **Pakninger og priser:** Tube med 30 g eller 100 g creme Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk. **Udlevering:** B. **Tilskud:** Generelt tilskud. Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres hos indehaveren af markedsføringstilladelsen: Galenica AB, P A Hanssons väg 41, SE 205 12 Malmö, Sweden, Tlf: +46 (0)40-32 10 95.

De med * markerede afsnit er omskrevet/forkortede i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé dateret 2018-02-01.



GALENICA

Galenica AB | Medeon Science Park | 205 12 Malmö

**Det var den sidste patientinformation
om Ovison (mometasonfuroat).**

Brug QR-koden til at bestille, send os en
e-mail på derma@galenica.se eller ring på
+4640-321095, så sender vi mere.

