

Du har blivit ordinerad:

FOTODYNAMISK TERAPI (PDT) MED DAGSLJUS FÖR SJÄLVBEHANDLING AV AKTINISKA KERATOSER

Din behandling av aktiniska keratoser innebär att ett läkemedel, Ameluz® (5-aminolevulinsyra), i gelform stryks på det drabbade området. Gelen tränger in i huden och i de skadade cellerna omvandlas den aktiva substansen till ett ljuskänsligt ämne som aktiveras vid belysning med dagsljus. Läkemedlet påverkar i huvudsak de celler som är skadade.

Checklista:

- Säkerställ att du har fått ett självbehandlingskit.
- Hämta ut ditt recept på Ameluz på apoteket i god tid. Förvara läkemedlet i kylskåp innan användning.
- Välj en behandlingsdag med minst +10°C.
- Läs broschyren noga som du fått i ditt självbehandlingskit.
- Scanna QR-koden nedan med din mobiltelefon för att titta på en instruktionsfilm som beskriver hur behandlingen ska gå till. Eller läs Ameluz bipacksedel på www.fass.se




Delas ut av vägledande sjukvårdspersonal



Galenica AB | Medeon Science Park | 205 12 Malmö | www.galenica.se

Exempel på reaktioner

Före behandling



15 minuter efter



Dag 4



Dag 6



Dag 7



Dag 11



Observera att reaktionerna kan skilja från person till person i så väl svårighetsgrad som tid.

Ameluz® (5-aminolevulinsyra) 78 mg/g gel, ATC: L01XD04, Rx, F.

Indikation: Behandling av aktiniska keratoser av mild till måttlig svårighetsgrad (Olsen grad 1 till 2) och områden med aktiniska keratoser och solskadad hud, s.k. field cancerization, hos vuxna. Behandling av yttlig och/eller nodulär basalcellscancer som inte lämpar sig för kirurgisk behandling på grund av möjlig behandlingsrelaterad morbiditet och/eller sämre kosmetiskt resultat hos vuxna. **Kontraindikationer:** Överkänslighet mot innehållsämnen, porfyri, soja eller jordnötter. Porfyri. **Varningar och försiktighet:** Ameluz rekommenderas inte för patienter som tar immunsuppressiva medel. Försiktighet ska iakttas för att undvika applicering av Ameluz i ögon eller på slemhinnor. Ameluz ska inte användas på hudområden påverkad av andra hudsjukdomar eller med tatueringar. **Graaviditet och amning:** Undvik användning under graviditet. Amning bör avbrytas i 12 timmar efter behandling med Ameluz.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.
Produktresumé: 07/2024. Galenica AB, Medeon Science Park, 205 12 Malmö.

