Behandling med Ovixan (mometasonfuroat)

Behandlingsstart
Skriv datum

Mjukgörare

Instruktion (tid/uppnådd symtomförbättring)

1 **Inledande behandling:**
använd Ovixan en gång varje dag.

2 **Underhållsbehandling:**
använd Ovixan två gånger per vecka.

Du hittar mer information om Ovixan på www.fass.se eller på bipacksedeln.

Ovixan+Oviderm-SE-018-260522

Ovixan® (mometasonfuroat) 1 mg/g kräm, stark glukokortikoid (grupp III) till utvärtes bruk för vuxna och barn från 2 år, Rx, F. **Indikation:** Symptomatisk behandling av inflammatoriska hudsjukdomar som svarar på behandling med glukokortikoider (utbredd plackpsoriasis undantagen). **Kontraindikationer:** Används inte vid facial rosacea, acne vulgaris, hudatrofi, perioral dermatit, perianal och genital klåda, blöjdermatit, infektioner, varicella, tuberkulos, syfilis, postvaccinala reaktioner eller på skadad hud. **Varningar och försiktighet:** Användning vid psoriasis ska övervakas noggrant. Används inte på eller i ögonen. Synrubbning kan uppstå. Långtidsbehandling och plötsligt avbrytande av behandling ska undvikas. Används med försiktighet till barn. **Graviditet och amning:** Används endast efter noggrant övervägande. Ovixan ska inte användas på eller omkring bröstvårtorna vid amning.
För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.
Översyn av produktresumén: 2024-11-14. Galenica AB, P A Hanssons väg 41, 205 12 Malmö.

Ovixan® (mometasonfuroat) 1 mg/g kutan lösning, stark glukokortikoid (Grupp 111) till utvärtes bruk för vuxna och barn från 2 år, Rx, F. Rekommenderas vanligen inte till barn under 2 år. **Indikation:** Symptomatisk behandling av inflammatoriska hudsjukdomar som svarar på behandling med glukokortikoider (utbredd plackpsoriasis undantagen). **Kontraindikationer:** Används inte vid facial rosacea, acne vulgaris, hudatrofi, perioral dermatit, perianal och genital klåda, blöjdermatit, infektioner, varicella, tuberkulos, syfilis, postvaccinala reaktioner eller på skadad hud. **Varningar och försiktighet:** Vid sensibilisering avbryts behandlingen. Innehåller propylenglykol som kan orsaka hudirritation. Eventuell infektion ska behandlas. Vid behandling på stor kroppsyta eller med ocklusion bör HPA-axel suppression kontrolleras regelbundet. Användning vid psoriasis ska övervakas noggrant. Används inte på eller i ögonen. Synrubbning kan uppstå. Långtidsbehandling och plötsligt avbrytande av behandling ska undvikas. Används med försiktighet till barn. **Graviditet och amning:** Används endast efter noggrant övervägande. Ovixan ska inte användas på eller omkring bröstvårtorna vid amning.
För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.
Översyn av produktresumen: 2025-06-18. Galenica AB, P A Hanssons väg 41, 205 12 Malmö.

Oviderm® (propylenglykol) 250 mg/g kräm, hudskyddande och uppmjukande medel. Oviderm är ett registrerat läkemedel som kan förskrivas eller köpas receptfritt. **Förpackningsstorlek:** 100 g, 500 g och 600 g dubbelförpackning (innehållande 500 g burk + 100 g tub). 500 g och 600 g ingår i läkemedelsförmånen. **Indikation:** Behandling av torr hud. **Varningar och försiktighet:** Oviderm ska inte användas på brännskadad hud. Undvik applicering i hörselgången eftersom propylenglykol kan vara ototoxiskt. Innehåller cetostearylalkohol som kan orsaka hudreaktioner. **Graviditet och amning:** Oviderm ska inte användas på eller omkring bröstvårtorna vid amning.
För fullständig förskrivarinformation och pris,se www.fass.se.
Översyn av produktresumén: 2024-12-11. Galenica AB, P A Hanssons väg 41, 205 12 Malmö.

GALENICA

Galenica AB | Medeon Science Park | 205 12 Malmö | www.galenica.se

Behandlingschema, till din patient som behandlas med Ovixan®

(mometasonfuroat)



GALENICA

Oviderm® (25% propylenglykol)

– behandlar torr hud

Oviderm® är ett mjukgörande läkemedel med samma ingredienser som Ovixan® kräm, men utan kortison. Propylenglykol har vattenbindande egenskaper. Viss antimikrobiell effekt har uppvisats mot vissa bakterier och jästsvampar, i synnerhet Malassezia furfor. Därför är Oviderm® ett utmärkt komplement till patienter som idag är nöjda med Ovixan® kräm. Läs mer på www.oviderm.se



Ovixan® (mometasonfuroat)

– finns både som kräm och lösning

Ovixan® finns både som kräm och lösning. Både krämen och lösningen appliceras tunt en gång dagligen tills läkning (rodnad och klåda försvunnit). Därefter påbörjas underhållsbehandling[1] med applicering två dagar per vecka under flera veckor. Ovixan® lösning innehåller även 30% propylenglykol.



[1] Vetenskapliga underlag: Atopisk dermatit. Uppsala, Läkemedelsverket, juni 2023

Nu var det slut på schema!

Skicka ett mail till derma@galenica.se,
så skickar vi fler.